





### Pré-grossissement

Mortalité\* cumulée



45 %



### Grossissement (huîtres collées)

Mortalité\* cumulée

17 % (+8%)



Croissance\* : +4 g





Poids individuel = 5 (± 2,3) g

Croissance\* : + 27 g

Poids individuel = 48 (± 20) g

Indice de qualité\*

12



\*période : avril 2022-juin 2022. Poids individuel, indice de qualité : juin 2022.

Pour accéder aux données de températures, O2 et salinité en temps réel :

Lien: <https://eu.aquareal-bioceanor.com>

Utilisateur: [crcm.sensithau@bioceanor.com](mailto:crcm.sensithau@bioceanor.com)


Mot de passe: [crcm@access21](mailto:crcm@access21)

Suivi préventif Malalgue: <https://www.smbt.fr/zoom-sur-le-suivi-preventif-et-regulier-malalgue/>






### Huîtres plates



Collage sur cordes  
(naissain 2021) : mars  
2022  
Poids moyen : 14 g


### Naissain 2020

Croissance : + 8 g  
Poids individuel = 26 (± 9) g



### Naissain 2021

Mortalité cumulée  
**16%** (sur cordes) ↓



Mortalité cumulée  
**64 % (+2%)**



### Moules - Taux de remplissage



Indice simplifié \*  
lagune  
**12,4** ↓



Indice simplifié \*  
mer  
**15,6** →

\* indice simplifié basé sur le protocole Ifremer T. Besse et J. Mazurié, 2003, moyenne sur la période : avril-juin 2022



- Des naissains d'huîtres creuses ont été mis à l'eau fin mars 2022 en lanternes et pearl nets. **La mortalité printanière sur le naissain a été particulièrement importante** (45% de pertes) **au mois de mai** quelles que soient la zone d'élevage et la ploïdie.
- La mortalité sur cordes a été relativement modérée.** Les mortalités les plus faibles ont à nouveau été observées sur les huîtres naturelles et particulièrement sur les huîtres issues du captage naturel 2021 à Thau (collées en janvier 2022).
- On constate une **reprise importante de la croissance des huîtres sur cordes durant le printemps.** Les plus fortes croissance ont été observées sur les huîtres triploïdes, toutes zones confondues.
- Des **huîtres plates** ont été collées sur cordes en mars 2022. Des mortalités importantes ont été constatées sur la zone de Mèze (30% de pertes).